

## Vaccinarea copiilor în 2023.

Toate vaccinurile de la 0 la 14 ani, recomandate de Institutul de Sănătate Publică  
([CLICK pe titlu pentru a citi tot articolul](#))

# SCHEMA NAȚIONALĂ DE VACCINARE



Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică

**PRIMELE 24 DE ORE**  
în maternitate

**VACCINUL ÎMPOTRIVA HEPATITEI B**  
VACCINUL BCG, CARE ARE ÎN COMPONENTĂ BACIL CALMETTE-GUERIN

**2 LUNI**  
**4 LUNI**  
**11 LUNI**

VACCINUL HEXAVALENT (DTPA-VPI-HIB-HEP. B), CARE ARE URMĂTOARELE ANTIGENE ÎN COMPONENTĂ: DIFTERIC, TETANIC, PERTUSSIS ACELULAR, POLIOMIELITIC TRIVALENT INACTIVAT, HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIP B, HEPATITIC B  
VACCINUL PNEUMOCOCIC

**12 LUNI**  
**5 ANI**

VACCINUL ROR (RUJEOLIC- RUBEOLIC- URLIAN), VIU ATENUAT, CARE CONȚINE ANTIGEN RUJELOIC, RUBEOLIC ȘI URLIAN.

**6 ANI**

VACCINUL TETRAVALENT (DIFTERO- TETANO- PERTUSSIS-POLIO), CARE ARE URMĂTOARELE ANTIGENE ÎN COMPONENTĂ: DIFTERIC, TETANIC, PERTUSSIS ACELULAR, POLIOMIELITIC TRIVALENT INACTIVAT.

**DUPĂ 9 ANI**

VACCINUL HPV

**14 ANI**

VACCINUL DIFTERO-TETANO-PERTUSSIS ACELULAR (DTPA)

1. Vaccinarea populației la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare

### Calendarul național de vaccinare

Vârsta recomandată <sup>1)</sup>	Tipul de vaccinare	Comentarii
primele 24 de ore 2-7 zile	Vaccin hepatitic B (Hep B) <sup>2)</sup> Vaccin de tip Calmette Guerin (BCG)	în maternitate
2 luni	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) Vaccin pneumococic conjugat	medicul de familie

4 luni	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) Vaccin pneumococic conjugat	medicul de familie
--------	---	--------------------

11 luni	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) Vaccin pneumococic conjugat	medicul de familie
12 luni	Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)	medicul de familie
5 ani	Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)	medicul de familie
5-6 ani	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar-poliomielitic (DTPa-VPI)	medicul de familie
14 ani	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar pentru adulți (dTpa)	medicul de familie

**NOTE:**

- 1) Vaccinarea copiilor abandonati în unitățile sanitare cu paturi se realizează la vârstele recomandate în Calendarul național de vaccinare sau, după caz, la alte vârste, în funcție de starea de sănătate a acestora.
- 2) În situația în care vaccinul hepatitic B nu este disponibil pentru administrare în primele 24 de ore de la naștere, copiilor născuți din mame AgHBs pozitive li se va aplica temporar următoarea schemă de vaccinare:

Vârsta recomandată	Tipul de vaccinare	Comentarii
6 săptămâni	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza I	medicul de familie

30 de zile de la prima doză	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza II	medicul de familie
30 de zile de la a doua doză	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) doza III	medicul de familie

La vârsta de 11 luni copiii vor fi vaccinați conform Calendarului național de vaccinare, respectiv vor primi a IV-a doză de vaccin diftero-tetano-pertussis acelar-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B).

Copiii născuți din mame AgHBs negative vor fi vaccinați conform Calendarului național de vaccinare începând cu vârsta de 2 luni, fără a mai fi necesară recuperarea dozei de vaccin hepatitic B care nu a fost administrată la naștere.

**PENTRU ADMINISTRAREA TUTUROR VACCINURILOR SE VOR UTILIZA NUMAI SERINGI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ.**